



X-Plain™

Anestesia General

Sumario

Puede ser que usted tenga programada una cirugía bajo anestesia general.

Este programa de educación al paciente le enseñará sobre los beneficios y los riesgos del uso de anestesia general.

Procedimiento

Para evitar que usted sienta dolor durante su cirugía, el anesthesiólogo le hará dormir hasta que la operación se acabe. Durante la operación el anesthesiólogo le vigilará y se asegurará que su corazón, sus pulmones y sus riñones funcionen correctamente.

Al principio, se le pondrá un suero en el brazo o en la mano para proveerle las medicinas.


Se le darán medicamentos que le harán dormir.

Desde ese momento en adelante no estará consciente de nada hasta que se despierte al final de la operación.

Puede que el anesthesiólogo le ponga un tubo en su vía respiratoria o la tráquea. El tubo se conectará a un respirador. Esto le permitirá recibir el oxígeno adecuado y los gases anestésicos que lo mantendrán dormido.

Después que se termina la operación, podrá despertarse. Cuando pueda respirar por sí mismo, se le quitará el tubo y se le llevará a la sala de recuperación o a la unidad de cuidado intensivo. Las enfermeras le vigilarán hasta que usted esté completamente despierto.

Durante su operación y con la ayuda de instrumentos médicos llamados monitores, el anesthesiólogo vigila cuidadosamente el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la concentración de oxígeno en la sangre.



Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

Riesgos y complicaciones

Debido a importantes adelantos en la tecnología y los medicamentos, la anestesia general es sumamente segura. Sin embargo, existen algunos posibles riesgos y complicaciones. USTED puede hacer mucho para prevenirlos.

Usted le debe dejar saber al anesthesiólogo sobre cualquier problema médico que pueda tener, tales como problemas del corazón, de los pulmones o de los riñones, derrames cerebrales y daño al hígado.

También le debe informar al anesthesiólogo si se le han hecho transfusiones de sangre, o si ha padecido de diabetes, tensión arterial alta, ictericia, depresión y otros trastornos psiquiátricos.

Usted también debe avisarle a su anesthesiólogo sobre cualquier experiencia anterior con los anestésicos y si estos le afectaron negativamente.

También es importante decirle a su médico si usted tiene problemas con ronquidos, si tiene algún diente flojo o se ha hecho algún trabajo dental, tales como puentes y coronas.

También es muy importante dejarles saber al anesthesiólogo y al cirujano acerca de cualquier medicamento que usted toma, incluso medicamentos que no requieren receta, tales como la aspirina o Advil™.

Los medicamentos que usted toma podrían interactuar con los medicamentos de la anestesia o podrían causar sangrado excesivo durante la cirugía.

También es importante decirles a sus médicos si usted es alérgico a cualquier medicamento – como los anestésicos – o alimento – como los huevos. Así los médicos saben cuales son los medicamentos a los cuáles usted puede ser alérgico.

Debido a que algunas reacciones raras a la anestesia pueden ser hereditarias, hágale saber a su médico si usted o CUALQUIER familiar suyo ha tenido algún problema con la anestesia en el pasado.

Puede que usted desarrolle reacciones alérgicas que se descubran durante la cirugía, tales como alergias a la cinta adhesiva, al látex (una sustancia presente en los guantes) y a las soluciones que contienen yodo.

Nausea y vómitos podrían ocurrir después de la cirugía. Esto se suele tratar con el uso de medicamentos antieméticos.

Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

Existe un pequeño riesgo de que ocurran infección en los pulmones, derrames cerebrales, ataques cardíacos y posiblemente la muerte durante o después del uso de la anestesia.

Estos riesgos son muy pequeños y más probables en personas que son mayores de edad y en pacientes que tienen problemas médicos o un historial previo de derrames cerebrales o ataques cardíacos.

Como el cuerpo se queda inmóvil durante la cirugía, se pueden formar puntos de presión. Dependiendo de la posición en la que usted esté durante la cirugía, si una parte del cuerpo recibe demasiada presión, en raros casos esto puede resultar en daño a los nervios, parálisis, ceguera y úlceras en la piel.

Se toman precauciones para evitar que esto suceda. Por lo tanto, es muy raro.

Si ocurre un sangrado excesivo durante la cirugía, el anestesiólogo, en consulta con el cirujano, puede decidir que se le haga una transfusión de sangre. Para la seguridad del paciente, esto se hace sólo cuando sea necesario.

Esta sangre se examina cuidadosamente para detectar enfermedades transmisibles, tales como la hepatitis o el SIDA. El uso de esta sangre es muy seguro, pero las infecciones con estas enfermedades conocidas u otras desconocidas todavía podrían ocurrir.

Asegúrese de dejarle saber a sus médicos si usted está en contra de las transfusiones de sangre por razones religiosas o de otra índole, aún en situaciones en que su vida esté en peligro.

Debido a que se le pone el tubo para respirar en la garganta, es posible que sienta la garganta adolorida después de la cirugía. Mientras el tubo se le coloca en la garganta, es posible que se lesionen los labios, la lengua, los dientes, e incluso hasta las cuerdas vocales. Esto es sumamente raro.

En raras ocasiones el área donde se inserta la línea intravenosa se puede infectar. Es posible que sea necesario tratarlo con aplicaciones de paños tibios y raramente, antibióticos.

El anestesiólogo está preparado para tratar cualquier reacción a los medicamentos usados en la sala de operaciones. En casos muy raros, estas reacciones podrían ser fatales a pesar del mejor esfuerzo de sus médicos. Por eso es muy importante informarle al anestesiólogo acerca de TODAS las alergias que usted padezca.

Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.

Asegúrese de avisarle al anesthesiólogo si hay alguna posibilidad de que usted esté embarazada. De ser así, se deben tomar precauciones especiales durante la operación.

Resumen

La anestesia general es muy segura. Sin embargo, como usted ha aprendido, existe cierta posibilidad de riesgos y complicaciones.

Déjele saber a sus médicos sobre cualquier síntoma nuevo que usted sienta después de su cirugía.

Se puede evitar la mayoría de las complicaciones a través de la buena comunicación.

Asegúrese de informarles a sus médicos sobre todas sus condiciones médicas, los medicamentos, las alergias y los anestésicos usados anteriormente.



Este documento es un resumen de lo que aparece en las pantallas de X-Plain. Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular.